

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Μολέ Ευαγγελία (1), *Μόσχου Δήμητρα* (1), Κουτσαντώνη Ευαγγελία (1), Τσατσάνη Παναγιώτα (1), Κοντοδημόπουλος Νικόλαος (2, 3), Γαζή Σουσάνα (1)

- (1) Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Γενικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα
 (2) Διοικητής Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, Αθήνα PhD,
 (3) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΨΑ και η ΑΣ, είναι νοσήματα που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα και ακολουθούνται διαφορετικές θεραπευτικές στρατηγικές, ανάλογα με την κλινική εικόνα.

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ

Αναδρομική μελέτη των φακέλων 118 ασθενών με ΨΑ και 86 με ΑΣ, μέσης ηλικίας 58.05 ± 11.61 και 51.84 ± 11.89 έτη αντίστοιχα, με μέση διάρκεια νόσου 98.85 ± 94.83 και 172.98 ± 144.93 μήνες αντίστοιχα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

	ΨΑ (n=118)	ΑΣ (n=86)
A/Γ (n)	42/76	74/12
Αξονική προσβολή (%)	22.03	100
Περιφερική προσβολή (%)	98.3	23.26
Ακτινολογική ιερολαγονίτιδα (%)	18.64	83.72
Δακτυλίτιδα (%)	16.95	6.98
Ενθεσίτιδα (%)	17.8	53.49
Ιριδοκυκλίτιδα (%)	0	16.28
Ονυχία (%)	12.71	0
BASDAI (mean±SD)	-	2.36±1.78
ASDAS TKE/CRP (mean±SD)	-	1.54±0.53/ 1.48±1.23
DAPSA (mean±SD)	5.64±4.52	-
ΜΣΑΦ παλαιότερα (%)	1.03	94.19
Πρεδνιζολόνη τώρα (%)	15.25	-
DMARD (MTX, LEF, CsA) (%)	64.37	-
Βιολογική θεραπεία (%)	86.44	100

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δεδομένα σχετικά με τα δημογραφικά, τα κλινικά χαρακτηριστικά, τον τρόπο ζωής και τη θεραπεία με Ψωριασική Αρθρίτιδα (ΨΑ) και Αγκυλοποιητική Σπονδυλοαρθρίτιδα (ΑΣ) στην Ελλάδα είναι περιορισμένα.

ΣΚΟΠΟΣ

Η καταγραφή των κλινικών παραμέτρων και της θεραπείας ασθενών με ΨΑ και ΑΣ που παρακολουθούνται στο νοσοκομείο μας.

